

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud

**GUIAS PARA EL MANEJO DE
VICTIMAS / SOBREVIVIENTES DE
AGRESION SEXUAL EN
SALAS DE EMERGENCIA Y
CENTROS DE SALUD**

SEGUN RECOMENDADAS POR EL
DEPARTAMENTO DE SALUD

APROBADO POR:

Rosa Pérez Perdomo, MD, MPH, PHD

Secretaria de Salud

27 de marzo de 2006, 3ra. edición



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Salud

Las agresiones sexuales son actos de violencia.
La atención de las necesidades de salud física, mental y legal de las personas sobrevivientes de agresiones sexuales es de primordial importancia para apoyarle en su proceso de recuperación.

De esta manera se previene el desarrollo de patologías secundarias que crean un impacto adverso en el bienestar de la persona, sus personas significativas, su familia y la comunidad.

La violación, la sodomía, el incesto y los actos lascivos e impúdicos son diversas manifestaciones de la agresión sexual.

Procedimientos	Visita Inicial	Visita de Seguimiento		
		En días*	A las dos (2) semanas	A las 12 semanas
II. Historial Psicosocial - Toda información que demuestre el estado emocional al momento del evento y el estado actual - Cernimiento de seguridad personal y apoyo por personas significativas - Participación en programas de ayuda	X X X	Actualizar X X	Actualizar X X	Actualizar X X
III. Examen Físico GENERAL Completo, con especial énfasis en la búsqueda de posibles traumas previos y actuales. Debe examinar cabeza, oro-faringe y la superficie corporal. GENITAL Externo e interno Se recomienda evaluación colposcópica , haciendo el procedimiento correspondiente según el protocolo y momento del evento.	X X**	De haber encontrado señales de trauma o tener historial de sintomatología que amerite examen. *Es importante usar su juicio clínico-forense. De ser necesario, consulte con un experto. (De tener alguna duda, se recomienda hacer el examen.)		
IV. Pruebas de Laboratorios - Todos los necesarios según la presentación de trauma - Pruebas de gonorrea, clamidia, sífilis, VIH, hepatitis B, embarazo (HCG), wet prep (tricomonas, Hemophilus, vaginitis, espermatozoides), PAP smear (para detección de HPV, espermatozoides), grupo sanguíneo, toxicología incluyendo Rohipnol, drogas de diseño y otras	X X		X Pruebas de embarazo, gonorrea, clamidia, wet prep (Tuaginalis y Vaginosis bacteriana), VIH Inspección visual de descarga genital	X Pruebas de sífilis, VIH y Hepatitis B

* Se recomienda visita, dentro de los primeros siete (7) días, si se halló trauma en la intervención inicial.

** Si la (el) paciente llega en las PRIMERAS 72 HORAS luego de la agresión, hacer uso del Rape Kit.

Los Rape Kits son distribuidos, libres de costo, por el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, Departamento de Salud.

— Puede comunicarse a los teléfonos: (787) 765-2285 / (787) 474-2028 durante horario laborable y al 1-800-981-5721, fuera de horas laborables.

Procedimientos	Visita Inicial	Visita de Seguimiento		
		En días*	A las dos (2) semanas	A las 12 semanas
Toma de muestras para evidencia forense (KIT) a utilizar en las primeras 72 horas después de la agresión: colección de material extraño, ropa de vestir y ropa interior en bolsas de papel, colección de residuos obtenidos durante el examen, muestra de raspado de uñas, muestra del cuero cabelludo, muestra de vello púbico, muestra de secreciones en vagina, oral y/o ano y muestra de saliva.	X 72 horas			
V. Plan de Manejo y Educación A. Manejo 1. Curativo de todo trauma 2. Preventivo: a. embarazo El contraceptivo post-coital que puede utilizarse: - Ovrál (2 tabletas en el momento y 2 tabletas 12 horas después) - Lo/Ovrál, Nordette o Levlen (4 tabletas en el momento y 4 tabletas 12 horas después) o Plan B b. enfermedades de transmisión sexual (clamidia, gonorrea, triconomas y vaginosis bacteriana) - Menores: esperar por los resultados de los cultivos - Adultos y adolescentes: Ceftriaxone 125 mg. , I.M., (+) metronidazole 2gm oral, (+), Azythromycin 1g oral en una sola dosis, o doxycyclina 100 mg., oral dos veces al día por siete días. (Debe verificarse dosis, peso, alergias y contraindicaciones usando los sustitutos correspondientes).	X	Según hallazgos	Según hallazgos	Según hallazgos

* Se recomienda visita, dentro de los primeros siete (7) días, si se halló trauma en la Intervención inicial.

** Si la (el) paciente llega en las PRIMERAS 72 HORAS luego de la agresión, hacer uso del Rape Kit.

Los Rape Kits son distribuidos, libres de costo, por el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, Departamento de Salud.

Puede comunicarse a los teléfonos: (787) 765-2285 / (787) 474-2028 durante horario laborable y al 1-800-981-5721, fuera de horas laborables.

